



開放時間

星期一至星期五 9:00am – 5:30pm

星期六、日及公眾假期 休息



聯絡資料

查詢及預約電話 9736 0997

傳真 2904 9799

電郵 colonsc@hku.hk

地址 香港薄扶林沙宣道5號
香港賽馬會跨學科研究大樓地下G06室



① 途經巴士：4, 4X, 7, 30X, 37A, 40, 40M, 71, 90B, 91, 94, 970, 970X, 973, A10


途經小巴：22, 22S, 22X, 23, 31, 31X

② 途經小巴：8, 28

註：資料以巴士公司最新公佈為準。



檢查流程



註①

會面地點：

香港大學－放射診斷學系－磁力共振／超聲波掃描部

香港薄扶林沙宣道5號香港賽馬會跨學科研究大樓地下低層3樓

註②

合作進行大腸鏡檢查的私家醫療中心地點（香港大學內視鏡中心保留最終檢查地點的決定權）：

九龍半島醫學中心

尚至醫療

仁德醫務中心

港怡醫院

九龍尖沙咀彌敦道19－21號九龍酒店商場1樓

香港中環皇后大道中122號尚至醫療大樓7樓

香港中環皇后大道中9號4樓

香港黃竹坑南風徑1號



HKU Med

Jockey Club Centre for
Clinical Innovation and Discovery
香港大學賽馬會臨床創新及研發中心

香港大學內視鏡中心 HKU Endoscopy Centre

賽馬會大腸癌預防及篩查計劃
Jockey Club Colon Cancer Prevention
and Screening Programme



捐助機構：



香港賽馬會慈善信託基金
The Hong Kong Jockey Club Charities Trust

同心 同步 同進 RIDING HIGH TOGETHER



背景

結直腸癌（俗稱大腸癌）雖然是香港最常見的一種癌症，但是這癌症是可以預防的。醫生通過大腸鏡檢查檢測大腸狀況及切除大腸息肉，是可以有效地預防大腸癌。

香港大學得到香港賽馬會慈善信託基金的捐助，開展了「賽馬會大腸癌預防及篩查計劃」。這計劃專為大腸癌高風險人士（如有家族成員曾患大腸癌的人士）提供大腸癌篩查服務，以協助他們預防大腸癌。

另外，為進一步推廣大腸癌篩查，香港賽馬會慈善信託基金亦捐助成立「香港大學內視鏡中心」，將大腸癌篩查服務擴展至香港市民。

除了提供大腸癌篩查服務外，我們亦會進行預防大腸癌的臨床研究，希望藉此可以找到一些會影響患大腸癌機會的因素，令市民大眾更有效地預防大腸癌。



宗旨

1. 為高風險家庭成員及市民大眾提供大腸鏡檢查服務；
2. 為高風險家庭成員作腸道微生物基因／宏基因研究，或可發現一些會增加或減少患大腸癌的因素，使市民大眾可以更有效預防大腸癌。



服務對象

香港大學內視鏡中心鼓勵以下人士接受大腸癌篩查服務：

- ◆ **合資格參加政府「大腸癌篩查計劃」的人士**
免費大便隱血測試 + / - 大腸鏡檢查（有關「大腸癌篩查計劃」的詳情，請參考衛生署的相關網站 www.ColonScreen.gov.hk）




- ◆ **關注大腸健康的人士**
自費參與大腸癌篩查



認識大腸癌

結直腸，又稱為大腸，是消化系統的最後部分。主要功能是吸收食物中的水分，通過蠕動使大便經由大腸及肛門排出。



大腸癌大多是由大腸息肉演變而成。由正常的細胞發展成大腸癌，過程可以長達十年或以上。腸壁內的息肉有不同類型，當中腺瘤性息肉演變成癌症的風險較高。要了解大腸內有沒有息肉及息肉的類型，最有效的方法是接受大腸鏡檢查，將檢查過程中發現的息肉切除並作病理化驗。

根據醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2017年大腸癌新症有5,635宗（在全部癌症新症個案中佔17%）；大腸癌的死亡個案有2,138宗（在癌症死亡個案中佔14.9%），是本港致命癌症中排第二位。由於人口老化、飲食及生活方式的改變，大腸癌的個案數目亦有上升趨勢。



大腸癌有什麼症狀？

如你有以下情況，便應向醫生諮詢是否需要接受大腸鏡檢查：

大腸癌症狀

- ◆ 大便帶血或大量黏液
- ◆ 無故情況下大便習慣改變，如腹瀉或便秘，並持續兩星期或以上
- ◆ 大便後持續有便意
- ◆ 腹部不適，如持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛等
- ◆ 體重驟降及感到疲累
- ◆ 貧血



患大腸癌高風險人士

- ◆ 有腸癌家族史，尤其是直系親屬（如父母或兄弟姐妹）患過大腸癌，且年輕時病發
- ◆ 家族成員患有遺傳性的大腸癌基因綜合症，如：連氏綜合症或家族性結直腸息肉綜合症
- ◆ 曾患大腸癌
- ◆ 曾有大腸息肉
- ◆ 大腸長期發炎，例如：潰瘍性結腸炎



一般市民在**50歲以上**，即使沒有症狀，也應該接受大腸癌篩查。因為及早發現和治療大腸癌，可以增加痊癒的機會。



篩查大腸癌方法



大便隱血測試

目的： 檢測大便是否帶有肉眼也察覺不到的微量出血，以獲得診斷和治療。

過程： 在家中採集大便樣本，並放入指定的收集瓶。收集到的大便樣本會被送往化驗所進行檢測。如果大便隱血測試結果呈陽性，醫生會再約見講解化驗結果及安排進行大腸鏡檢查。



大腸鏡檢查

目的： 進行更準確的大腸檢查，檢測大腸狀況，避免息肉演變成癌症。

過程： 在大腸鏡檢查前，病人會先接受鎮靜麻醉，使病人放鬆及減少檢查時的不適。在檢查時，醫生會將一支柔軟的內視鏡，由肛門部位放入以檢查大腸，過程中如發現息肉，醫生會在評估情況後將息肉切除並送作化驗。

